

ТЕСТЫ ПО ЦЕФАЛГИЯМ

Выберите один правильный ответ:

1. Показанием к технике уравнивания верхнего шейного ганглия является:

- а) диспептические явления
- б) аменорея
- в) цефалгия
- г) нарушение абдоминального кровотока
- д) нет верного ответа

2. Верхний шейный ганглий расположен:

- а) на 2 см ниже сонного отверстия
- б) на уровне поперечного отростка С7
- в) на 5 см ниже сонного отверстия
- г) на уровне поперечного отростка С5
- д) на уровне поперечного отростка С6

3. Борозда или канал позвоночной артерии атланта располагается на:

- а) Задней дуге атланта
- б) Передней дуге атланта
- в) Верхней суставной ямке
- г) Нижней суставной ямке
- д) нет верного ответа

4. Первый этап остеопатической коррекции при острой цефалгии, сопровождающейся артериальной гипертензией:

- а) тракт шейного отдела
- б) коррекция СБС
- в) уравнивание грудобрюшной диафрагмы
- г) расслабление брыжейки тонкой кишки
- д) работа на поясничных симпатических ганглиях

5. Возможная область локализации цефалгии при дисфункции ВНЧС:

- а) лобная
- б) затылочная
- в) область глабеллы
- г) височная
- д) нет верного ответа

6. Техника выбора при цефалгии, вызванной венозным застоем крови:

- а) тракт шейных позвонков
- б) внутрикостные техники на нижней челюсти
- в) CV 4
- г) техника венозных синусов
- д) коррекция скуловой кости

7. Остеопатическое лечение пациента с цефалгией на фоне выраженной гипертермии:

- а) показано
- б) относительно показано
- в) противопоказано
- г) относительно противопоказано

д) Нет верного ответа

8. Остеопатические техники, эффективные у пациентов с цефалгией на фоне хронического гайморита:

- а) на решетчатой кости
- б) на височной кости
- в) на теменной кости
- г) с СБС
- д) Нет верного ответа

9. Цефалгия, усиливающаяся от резкого света свидетельствует о:

- а) проблеме слезного канала
- б) соматической дисфункции шейного отдела
- в) задействована твердая мозговая оболочка
- г) задействована позвоночная артерия
- д) Нет верного ответа

10. Техники, противопоказанные при цефалгии у пациента с повышенной судорожной готовностью:

- а) Митчелла
- б) БЛТ
- в) трастовые
- г) на СБС
- д) нет верного ответа

11. Техники, которые предпочтительнее использовать при лечении цефалгий в пожилом возрасте:

- а) прямые
- б) трасты
- в) непрямые
- г) рекойл
- д) нет верного ответа

12. Техники, которые предпочтительнее использовать при сочетании цефалгии и болезни Бехтерева:

- а) прямые
- б) непрямые
- в) рекойл
- г) трасты
- д) нет верного ответа

13. Состояние, при котором техника расслабления грудобрюшной диафрагмы будет эффективна:

- а) цефалгия, связанная с нарушением циркуляции жидкости в теле
- б) цефалгия на фоне соматической дисфункции ВНЧС
- в) соматическая дисфункция решетчатой кости
- г) компрессия СБС
- д) Нет верного ответа

14. Состояние, с которым может быть связана цефалгия в сочетании с депрессивными нарушениями после родов:

- а) соматическая дисфункция лонного сочленения

- б) разрыв промежности
- в) фиксация крестца
- г) перенапряжение поясничного региона
- д) нет верного ответа